

ЛІПОЛІТИКИ

DR.LIPO + V



Стерильна упаковка в 10 флаконів по 5 мл

dr. Lipo + V - золотий стандарт ліполітика, який може застосовуватися по обличчю.



Опис

dr. Lipo + V - золотий стандарт ліполітика, який може застосовуватися по обличчю.

У препараті присутні прямі ліполітики в невисоких концентраціях: дезоксихолат натрію - 0,3% і фосфатидилхолін - 1%.

Дезоксихолат натрію сприяє руйнуванню мембрани адипоцита, куди проникає фосфатидилхолін і емульгує жир, який легко виводиться з організму природним шляхом.

Пептидний комплекс з факторами росту запускають процес неколагенезу, а L-карнітин з міорелаксантом забезпечують поліпшення лімфодренажу і відчутний ліфтинговий ефект.

Область застосування

Область застосування: Обличчя.

Тип шкіри: Усі типи шкіри

Стать: Жіноча, Чоловіча

Для ін'єкцій.

Склад

Phosphatidylcholine 1%, sodium deoxycholate 0.3%, L-carnitine 0.5%, acetyl hexapeptide-8 0.5%, glutathione 0.3%, arbutin, vitamins C, B2, B3, B12, SP1-EGF, SP1-FGF1, palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl tetrapeptide-7, dipeptide, arginine, arbutin, adenosine, 1,2-hexanediol.

Показання



- корекція жирових відкладень і ліфтинг ділянок обличчя;
 - ремоделювання контуру обличчя, в т.ч. брів, другого підборіддя;
 - корекція гриж нижньої повіки;
 - стимуляція периферійних кровоносних і лімфатичних судин, виражений детокс ефект.
-

Протипоказання



Вік до 27 років.

Вагітність, період лактації у жінок.

Наявність у пацієнта цукрового діабету, психічних захворювань, аутоімунних захворювань, онкологічних захворювань, гострих і хронічних інфекцій, шкірних проблем у місці ін'єкції (наприклад, запалення, герпес), індивідуальної непереносимості компонентів препарату, приймання антикоагулянтів, приймання антибіотиків (до 2 тижнів після завершення антибіотикотерапії).

Інструкція із застосування

Провести демакіаж і очищення шкіри. Обробити ділянку розчином хлоргексидину або 70° спиртом, після закінчення процедури провести обробку.

Перед застосуванням перемішати препарат шляхом інтенсивного струшування флакона протягом 2-3 хвилин.

ОБЛАСТЬ ОБЛИЧЧЯ ін'єкується інфільтраційною технікою на глибину 4-8 мм по 0.1 - 0.3 ml на вкол з кроком 0.5 - 1.5 см залежно від зони голкою 30-32 G. Ін'єкції проводяться строго під кутом 90°. Положення клієнта під час введення препарату строго вертикальне, напрямок голки знизу-вгору і знизу-діагонально. Максимальна кількість препарату в роботі за сеанс до 8.0 ml.

ТЕХНІКА проведення процедури. Великим вказівним пальцем проводять защип шкірно-жирової складки, ін'єкції проводять безпосередньо у валик усередині защипа, після ін'єкції утримують валик упродовж 10-30 сек.

Курс складається з 3 процедур з інтервалом між процедурами 10-14 днів (встановлюється фахівцем індивідуально, виходячи з анамнезу пацієнта).

Термін придатності

36 місяців з дати виробництва
Термін придатності вказано на упаковці

Умови зберігання

Зберігати за температури від 1 °С до 30 °С.
Не піддавати впливу сонячного світла.