

## ПРОТОКОЛ

### **MIXO Volume**

Дермальний філер з лідокаїном

#### **СКЛАД**

Гіалуронова кислота – 20 мг/мл, Лідокаїн - 3 мг/мл

#### **ФОРМА ВИПУСКУ**

Шприц 1,1 мл + 2 голки 27G, Канюля 27G

#### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати при кімнатній температурі при температурі до 25°C , не заморожувати.

#### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

Термін придатності дивитись на упаковці. Не використовувати після кінцевої дати, вказаної на упаковці.

#### **ВИРОБНИК**

Dermakor CO., Ltd. (Південна Корея)

#### **ОПИС**

Стерильний прозорий гель у шприці. Філери MIXO на основі високомолекулярної гіалуронової кислоти нетваринного походження. MIXO - це монофазний філер у складі має мікрогранули стабілізованої гіалуронової кислоти з використанням сучасної технології DMCT. Завдяки цій технології збільшується кількість поперечних зв'язків, та знижує рівень ендотоксину, який викликає алергічні реакції та побічні ефекти. Завдяки високій в'язкопружності і когезивності філери MIXO тривалий час підтримують необхідний об'єм, не мігрують і не деформуються в тканинах під впливом міміки. Висока зшивка гіалуронової кислоти дозволяє продлити ефект від 9 до 12 місяців. Філер самостійно біорозкладається та виводиться організмом.

Дермальні філери МІХО мають оптимальний рівень рН 5.5-8.5, це робить процедуру комфортною для пацієнта і клієнта. Лідокаїн у складі філерів МІХО виконую знеболювальну дію при введенні та в після процедурний період. Гель має м'яку структуру, легко приймає потрібну форму і об'єм.

Філери мають сертифікацію ЕС, а також пройшли сертифікацію на території України.

## **ДІЯ**

- Корекція будь-яких вікових змін рельєфа шкіри
- Заповнення глибоких складок та заломів
- моделювання контуру обличчя

## **ПОКАЗАННЯ**

- Втрата об'єму лицевих зон
- Глибокі вікові зморшки

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

- Підвищена чутливість до гіалуронової кислоти
- Вагітність та період лактації
- Онкологічні новоутворення
- Забороняється проводити процедуру пацієнтам, які не досягли 18 річчя
- Гострі запальні процеси
- Пошкодження шкіри в місцях ін'єкцій
- Схильність до формування келоїдних рубців
- Порушення згортання крові
- Епілепсій

## **ТЕХНІКИ**

Класична

## **ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ**

Корекція будь-яких вікових змін рельєфу шкіри (заповнення глибоких складок), корекція лицьових зон із дефіцитом об'єму (влична, підборідна і скронева ділянки).

## **ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ**

Переконайтесь, що упаковка та флакон немає пошкоджень та відповідає заявленим характеристикам. Провести демакіяж, обробити поверхню розчином хлоргексидину, після закінчення процедури повторити обробку зони ін'єктування. Введення філеру проводиться в середній/глибокий шар дарми голкою 27G на глибину 2.5-3 мм.

## **ТРИВАЛІСТЬ**

9-12 місяців

## **КУРС ПРОЦЕДУР**

1 раз в 9-12 місяців